

## 半身麻醉說明及注意事項

親愛的患者，您的病情經診治後，認為手術為必要之治療方式，而在手術過程中，為了使手術能順利進行，以及使您的生理狀態維持在最穩定的狀態。因此，您手術時必須接受本院麻醉科醫療團隊所提供之麻醉醫療服務，為了使您了解整個麻醉進行過程，茲將半身麻醉實行步驟以及可能發生之副作用及併發症說明如下：

### 一、半身麻醉實行步驟：

- (一) 首先在您身上接上生理監視器，以監測您的血壓、心跳、血中氧氣濃度等生理數值。
- (二) 接著請您在手術床採取側睡姿勢，雙手抱膝，呈C字型（蝦米狀）。



- (三) 在您的背後以消毒溶液消毒後，在適當的位置，以極細的脊髓穿刺針進行脊髓穿刺，並注入適當之麻醉藥物。
- (四) 在手術過程中，以適當藥物來維持您的生理狀態，以利手術進行。
- (五) 待手術結束後，您的意識、呼吸功能及各種生理指標均恢復正常，即可回到病房休息。

二、任何醫療服務都有一定的風險，故在您接受我們所提供之麻醉醫療時，部份患者有可能會發生以下之副作用及併發症：

- (一) 如果您目前患有心臟病、高血壓等心臟血管系統之疾病或腦血管疾病，較易引起突發性的心臟病變或腦血管病變等併發症。
- (二) 如果您目前患有糖尿病，較易因血糖不穩定而產生相關併發症之情形。
- (三) 如果您目前患有肺部疾病，較易發生氣喘或呼吸功能失調等呼吸系統之併發症。
- (四) 如果您是接受急診手術、空腹時間不足六小時、懷孕或少數對麻醉藥物較為敏感之患者，於手術麻醉時較易產生嘔吐而造成吸入性肺炎之可能。
- (五) 您在接受手術麻醉醫療的過程中，有可能因為您的體質而對某些藥物或輸血時產生過敏反應。
- (六) 有極少數之患者於手術後可能會有頭痛之現象（約千分之一），術後建議平躺六至八小時可減少頭痛發生的機會。
- (七) 有極少數之患者於手術後可能會導致短期或長期之神經傷害（約萬分之一）。

如仍有任何麻醉醫療之問題請與病房護理站或本院麻醉科連絡，我們將竭誠為您解說，祝您早日康復！