



【 肛門直腸用藥 】

使用藥品前、後都要將手洗乾淨，或是請別人為你使用藥物會更方便。

一、**肛門栓劑**：如 Alcos-anal Supp, Bisadyl Supp, Voren Supp, Xylmol Supp

1. 肛門栓劑像子彈型，天熱時會變軟，可放冰箱 30 分鐘使之變硬。
2. 使用前要先除去外包裝，用水濕潤。下腿伸直，上腿向腹部彎曲。
3. 用一手把屁股往上拉，露出肛門口，用食指將栓劑由圓滑的一端塞入肛門約 5 公分。
4. 夾住屁股，保持臥姿約 15 分鐘，不要站立或走動，以防有栓劑排出的反應。
5. 栓劑不用時，應儲藏在陰冷處，以免過熱融化而變形。

二、**肛門軟膏**：如 Alcos-anal Ointment, High-Xylmol Ointment

先將肛門部位洗淨並擦乾，用少量的軟膏塗抹於肛門四週。

三、**直腸軟膏**：如 Alcos-anal Ointment, High-Xylmol Ointment

1. 藥塗於肛門較內部時，可將藥盒內所附的長軟管旋轉至藥膏管口上，再插入肛門內。
2. 輕輕指壓及轉動藥膏管後拿出，藥膏即可均勻塗抹於傷口。
3. 使用後將長軟管跟藥膏管分開，長軟管用肥皂和溫水洗淨。

此用藥指導卡並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。