



【 Mafarin 2.5 mg 脈化寧錠 (Warfarin) 】

臨床用途

是一種口服抗凝血劑，可以防止血栓形成。

服用方法

請遵照醫師指示服藥，通常每天一次，同一時間服用。切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

注意事項

1. 若您已懷孕、計劃懷孕、哺乳或有腎病、肝病、高血壓或其它任何疾病，使用前請先告知醫師。
2. 用藥期間請使用有效的避孕方式，若您有任何的懷孕跡象，請立刻通知醫師。
3. 須定期抽血檢查PT(凝血酶原時間)及INR(國際標準凝血酶原時間比)，請務必遵循醫囑指示。
4. 服藥後較易發生出血情形，故請避免容易受傷之運動或活動，同時建議您刷牙或使用牙線時力道放輕，最好使用軟毛牙刷；刮鬍鬚時建議您使用電動刮鬍刀，當您使用尖銳物品(如：剪刀、刀片或指甲刀)時，請特別小心留意。
5. 接受手術或拔牙前，應主動告知醫師目前正在服用Warfarin，以免發生凝血異常狀況。
6. 若您有使用任何其它藥物(包括成藥、中草藥、西藥等)，看診時務必告知醫師。
7. 富含維生素K飲食(如：綠茶、深綠色蔬菜<菠菜、甘藍菜、綠花椰菜>及植物油)會影響Warfarin的作用，所以服用Warfarin期間，應維持每天固定量攝取，避免突然攝取過多或不吃。

可能產生之副作用

若出現不尋常出血症狀，如：流鼻血、咳血、突然瘀傷、疲倦、糞便顏色變深變黑、尿液成紅色或暗褐色、刷牙時有血絲或不曾發生過的頭痛、腹瀉和背痛時，則須立即就醫。

此用藥指導卡並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。