



## 【 口服抗生素藥水的泡法 】

藥名	新鮮藥水泡製法	藥水保存溫度	保存天數
Amolin 萬博黴素	加冷開水搖勻至瓶身標示處 泡成 60ml 白色懸浮液	攝氏 2~8 度 (冰箱冷藏)	7 天
Augmentin 安滅菌	加冷開水搖勻至瓶身標示處 泡成 35ml 白色懸浮液		7 天
Ulexin 優力黴素	加冷開水搖勻至瓶身標示處 泡成 60ml 粉紅色懸浮液		7 天
Klaricid 開羅理黴素	加入 37ml 冷開水與藥粉顆粒搖勻 泡成 70ml 乳白色懸浮液	攝氏 25 度	14 天
Zithromax 日舒	加入 9ml 冷開水與藥粉搖勻 泡成 15ml 乳白色懸浮液	室溫陰涼處	5 天

- 注意事項：1.此類泡好之抗生素藥水，請盡量遵守建議之保存溫度，以防藥效變差或是變質。  
 2.新鮮泡製藥水若超過冷藏保存天數，請丟棄勿繼續服用。  
 3.泡製前請先搖晃藥瓶，將藥粉搖散。  
 4.藥水每次倒出服用前請先振搖。

此用藥指導卡並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。