



【 Nitroglycerin 舌下錠 (Nitrostat) 】



臨床用途

冠狀動脈擴張劑，主治：心絞痛(狹心症)。

服用方法

1. 胸痛或壓迫性胸悶發作時，立刻坐下或蹲下，迅速取舌下錠一粒含在舌下，直到完全溶解，不可咬碎及整粒吞服。
2. 含藥一至五分鐘後即可減輕疼痛。
如未改善再含一粒，五分鐘後仍未減輕，再含第三粒。
十五分鐘內服用三粒，仍舊胸痛應立即就醫。
3. 含此藥粒時不要吞口水、吃東西、喝飲料、抽煙或漱口。

注意事項

1. 含藥後會有短暫頭昏眩暈感，可藉深呼吸或將頭部置於兩腿膝蓋間以減輕症狀。
2. 請將本藥置於原裝棕色瓶內(需避光)，並栓緊瓶蓋，放置於小孩拿不到的地方。
3. 此舌下錠要隨身攜帶，但不宜貼身存放，因體溫可能減輕藥效。
4. 若需減藥量，或發現服藥次數不斷增加，請告知醫師。如需停藥，應逐漸減少藥量。

此用藥指導卡並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。