

檢驗項目：Rubella IgG

健保編號：140441，64（婦產科專用） 德國麻疹 IgG 抗體

院內檢驗 委外代檢

檢體採檢：血清 Serum，採檢量 3ml，病患不需空腹。

採檢容器：白蓋真空採血管。

報告時效：一般件：3 個工作天

參考區間：Non-reactive：0.0~4.9 IU/mL；Reactive： ≥ 10.0 IU/mL；Grayzone：5.0~9.9 IU/mL。

危險值：無。

臨床意義：

後天性德國麻疹病毒感染，分布於世界各地，春季和早夏易形成流行性感染，其特徵是溫和性的斑丘疹、發燒不舒服、淋巴腺病。但先天性德國麻疹病毒感染，尤其是孕婦若在妊娠期頭四個月感染了德國麻疹病毒，小孩則會有破壞性的先天性德國麻疹癥狀（CRS），如出生時體重太輕、白內障、重聽、先天性心臟病、智力不足及先天性畸形等徵兆。

德國麻疹出現臨床表徵後，抗體效價逐漸上升，其抗體 IgG 可持續終生。因此，個體血清中測得其 IgG，表示過去已經感染過德國麻疹或是曾經接種過疫苗。德國麻疹 IgG 抗體陰性，有可能再次感染，無法達到保護作用。

補單、複檢時效：14 天。

影響檢驗結果的原因：無。

是否需簽署同意書：否

注意事項：無。